

Lösung 28: Wertetabellen parametrischer Funktionen – Cast away



Lösungen der Aufgaben

1. Aufgabe:

Wenn die Wertetabelle angezeigt ist, kannst du mit der Cursor-Taste [▼] die zunächst nicht sichtbaren Zeilen ansehen.

$$x_1(3,8) = 0,3125 \quad y_1(3,8) = 2,6875$$

T	x1	y1
3.5	0.3333	2.6666
3.6	0.326	2.6739
3.7	0.3191	2.6808
3.8	0.3125	2.6875

FORM DEL ROW G-COM G-PLT

2. Aufgabe:

$$x_1(T) = \frac{3}{2T+2} \Rightarrow 2T+2 = \frac{3}{x_1} \Rightarrow T+1 = \frac{1,5}{x_1}$$

$$\Rightarrow T = \frac{1,5}{x_1} - 1$$

Durch Einsetzung folgt :

$$y_1 = \frac{3T+1,5}{T+1} = \frac{3(\frac{1,5}{x_1}-1)+1,5}{\frac{1,5}{x_1}} = \frac{x_1(\frac{4,5}{x_1}-3+1,5)}{1,5} = \frac{4,5-1,5x_1}{1,5} = 3 - x_1$$

3. Aufgabe*:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} y_1(T) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{3T+1,5}{T+1} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{3+\frac{1,5}{T}}{1+\frac{1}{T}} = \frac{\lim_{T \rightarrow \infty} 3 + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1,5}{T}}{\lim_{T \rightarrow \infty} 1 + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T}} = \frac{3-0}{1-0} = 3$$

$$\lim_{T \rightarrow \infty} x_1(T) = \lim_{T \rightarrow \infty} (3 - y_1(T)) = \lim_{T \rightarrow \infty} 3 - \lim_{T \rightarrow \infty} y_1(T) = 3 - 3 = 0$$

4. Aufgabe*:

Im *Tabellen-Editor* hebst du mit den Cursor-Tasten die 4.Zeile hervor gibst die y-Koordinate der zweiten parametrischen Funktion ein.

[VARS] [F4] [F3] [1] [×] [VARS] [F4] [F4] [1] [EXE]

```
Table Func :Param
x1|B3÷(2T+2)
y1|B(3T+1.5)÷(T+1)
x2|Bx1+y1
y2|Bx1×y1
X1S:
Y1S:
SEL DEL TYPE COLR RANG TABL
```

Anschließend rufst du mit der Taste [F5] den Menüpunkt RANG auf und gelangst zur *Tabellenbereichsanzeige*.

[0] [EXE]
 [1] [0] [EXE]
 [1] [EXE]

```
Table Range
T
Start:0
End :10
Pitch:1
```

Nachdem du mit [EXIT] zum *Tabellen-Editor* zurückgekehrt bist, wählst du den Menüpunkt TABL mit [F6], um die Wertetabelle erstellen zu lassen. Mit der Cursor-Taste [▶] kannst du die zunächst nicht sichtbare Spalte ansehen.

Lösung 28: Wertetabellen parametrischer Funktionen – Cast away

Das Produkt der x- und y-Koordinate der ersten parametrischen Funktion ist für ganzzahlige T-Werte zwischen 0 und 10 bei T = 0 maximal.

$$x_1(0) \cdot y_1(0) = 2,25$$

T	Yt1	Xt2	Yt2
0	1.5	3	2.25
1	2.25	3	1.6875
2	2.5	3	1.25
3	2.625	3	0.984375

Cast away

5. Aufgabe:

Im *Tabellen-Editor* hebst du mit den Cursor-Tasten die 1.Zeile hervor und gibst die parametrischen Funktionen ein.

```
[ 1 ][ 2 ][ X,θ,T ] [EXE]
[ 8 ][ 0 ][ - ] [ 3 ][ 0 ][ X,θ,T ] [EXE]
[ √ ]S [ ( ) [ VARS ] [ F4 ] [ F3 ] [ 1 ] [ x2 ] [ + ] [ F4 ] [ 1 ] [ x2 ] [ ) ]
[EXE]
[ 0 ] [EXE]
```

```
Table Func : Param
X1: 12
Y1: 80-30T
X2: sqrt(X1^2+Y1^2)
Y2: 0
```

6. Aufgabe:

Mit der Taste [F5] gelangst du zur *Tabellenbereichsanzeige* und gibst als Startwert 0 und als Endwert beispielsweise 5 ein sowie die Schrittweite 1. Nachdem du mit [EXIT] zum *Tabellen-Editor* zurückgekehrt bist, lässt du mit [F6] eine Wertetabelle erstellen.

Der kleinste Abstand des Schiffes von Carsten zu den Zeiten, bei denen er eine Notsignalrakete abschießt, beträgt ca. 31,24 km bei T = 2. Da seine Notsignale nur in einem Umkreis von 30 km zu sehen sind, wird er von diesem Schiff nicht gerettet.


T	Xt1	Yt1	Xt2
0	0	80	80
1	12	50	51.419
2	24	20	31.24
3	36	-10	37.363

7. Aufgabe:

Mit [V-Window]^S gelangst du zum *Betrachtungsfenster* und gibst dort die angegebene Einstellung ein.

```
[ (- ) ][ 1 ][ 0 ][ 0 ] [EXE]
[ 1 ][ 5 ][ 2 ] [EXE]
[ 1 ][ 0 ] [EXE]
[ (- ) ][ 3 ][ 4 ] [EXE]
[ 9 ][ 0 ] [EXE]
[ 1 ][ 0 ] [EXE]
```

Mit [EXIT] [F6] musst du die Wertetabelle erneut anzeigen lassen, um für die graphische Darstellung den Menüpunkt G·PLT mit [F6] aufrufen zu können.



Lösung 28: Wertetabellen parametrischer Funktionen – Cast away

8. Aufgabe:

Die vektorielle Parametergleichung für die Gerade g, auf der sich das Schiff bewegt, ergibt sich direkt aus den Funktionsgleichungen der parametrischen Funktion.

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} x(T) \\ y(T) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12T \\ 80 - 30T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 80 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 12 \\ -30 \end{pmatrix}$$

9. Aufgabe*:

$$h: \vec{x} = \vec{a} + r \cdot \vec{m} \quad r \in \mathbb{R}$$

Da die Gerade h den Ursprung (0/0) enthält, lässt sich als Stützvektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ verwenden.

Wegen der Orthogonalität von h zu g gilt für den Richtungsvektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} m_x \\ m_y \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} m_x \\ m_y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 12 \\ -30 \end{pmatrix} = 12 \cdot m_x - 30 \cdot m_y = 0$$

Als Lösung erhältst du beispielsweise $m_x = 5$ und $m_y = 2$ und damit den zu $\begin{pmatrix} 12 \\ -30 \end{pmatrix}$ orthogonalen Richtungsvektor $\vec{m} = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

10. Aufgabe*:

Der Schnittpunkt der Geraden g und h ergibt sich durch Gleichsetzen der vektoriellen Parametergleichungen.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 80 \end{pmatrix} + T \begin{pmatrix} 12 \\ -30 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{I:} \quad 12 \cdot T = 5 \cdot r$$

$$\text{II:} \quad 80 - 30 \cdot T = 2 \cdot r$$

$$2,5 \cdot \text{II} - \text{I:} \quad 200 - 87 \cdot T = 0 \quad \text{bzw.} \quad 200 = 87 \cdot T$$

Es folgt $T = \frac{200}{87} \approx 2,30$ und $r = \frac{12}{5} \cdot T = \frac{160}{29} \approx 5,52$.

Der Schnittpunkt der Geraden liegt bei $(5 \cdot r / 2 \cdot r) = \left(\frac{800}{29} / \frac{320}{29} \right) \approx (27,59 / 11,03)$.

Lösung 28: Wertetabellen parametrischer Funktionen – Cast away

Natürlich kannst du das Gleichungssystem auch im *Gleichungs-Modus* des Graphikrechners lösen. (siehe 2. Arbeitsblatt)

Der Abstand des Schiffes von Carsten ist minimal, wenn es sich im Schnittpunkt der Geraden g und h befindet, da die Gerade h das Lot vom Ursprung (0/0) auf die Gerade g, auf der sich das Schiff bewegt, beinhaltet.

Der minimale Abstand beträgt $\sqrt{\left(\frac{800}{29}\right)^2 + \left(\frac{320}{29}\right)^2}$ km $\approx 29,71$ km.

Das Schiff erreicht diesen bei $T = \frac{200}{87} \approx 2,30$.

11. Aufgabe:

Da sich das Schiff in einer Stunde 12 km östlich und 30 km südlich bewegt, legt es in dieser Zeit $\sqrt{12^2 + 30^2}$ km $\approx 32,31$ km zurück. Es besitzt also eine Geschwindigkeit von ca. 32,31 km/h.